

Samenvatting Webinar Yarriz Lemmers

Basis tandheelkunde voor de balie- en backoffice

Datum: 23 november 2020

Start meeting: 20.00 u

Afgerond: 22.16 u

Tandheelkundige begrippen:

Melkgebit:

51 t/m 55 = rechter bovenkaak

61 t/m 65 = linker bovenkaak

71 t/m 75 = linker onderkaak

81 t/m 85 = rechter onderkaak

Volwassen gebit:

1^e kwadrant = rechter bovenkaak (11 t/m 18)

2^e kwadrant = linker bovenkaak (21 t/m 28)

3^e kwadrant = linker onderkaak (31 t/m 38)

4^e kwadrant = rechter onderkaak (41 t/m 48)

Molaren: grote kiezen

Premolaren: kleine kiezen

Cuspidaten: hoektanden

Incisieven: voortanden

Cariës: tandbederf/ gaatje

Endo: wortelkanaalbehandeling waarbij de zenuwen uit de kies worden gehaald

Element: tand of kies

Gingivitis: ontstoken tandvlees

Parodontitis: ontsteking van het tandvlees waarbij ook het bot is betrokken

Kroon: kapje van metaal of porselein om een kies te verstevigen

Facing: schildje van composiet of porselein wat op de voortanden wordt geplaatst

Bleken: tanden witter maken d.m.v. waterstofperoxide

Implantaat: schroef van titanium die in het kaakbot wordt geplaatst

Invisalign/ Airsmile: doorzichtige uitneembare beugels waarmee de tanden recht kunnen worden gezet

- Hiermee zijn alleen kleine correcties mogelijk

Slotjes beugel: vaste beugel met slotjes (brackets) waarmee de tanden rechtgezet worden

- Hiermee kan je kiezen en tanden alle kanten op bewegen

Glazuur: buitenste gedeelte van een tand/ kies

Tandbeen: middelste gedeelte van een tand/ kies

Zenuw: binnenste gedeelte van een tand/ kies

Cofferdam/Rubberdam: Lapje die om een element geplaatst kan worden om het element droog te leggen

Soorten ziekten en behandelingen:

Cariës → vullen:

Zit er een gaatje in het glazuur, dan noemen we het beginnende cariës. Beginnende cariës hoeft niet altijd direct gevuld/ behandeld te worden. Zodra het gaatje in het tandbeen zit dan moet de kies gevuld/ behandeld worden (zie PowerPoint Lemmers voor stappen voor vullen).

Parodontitis (>5 mm + botafbraak zichtbaar op foto):

Behandeling bestaat uit: Initiële behandeling bij de mondhygiëniste, instructies, 3 maanden na behandeling kan het maximale resultaat worden bekeken en verwacht.

LET OP: de eerste afspraak bij de mondhygiënist voor parodontitis is altijd een meting!

Elke patiënt moet na een initiële behandeling elke 3 a 4 maanden (tenzij anders vermeld) terug komen voor nazorg bij de mondhygiënist.

Wortelkanaalbehandeling (endo):

Opvullen van de zenuwkanalen nadat deze kanalen voldoende zijn gevijld en gespoeld met NaOCl (natriumhypochloriet). Het slagingspercentage van een endo is 78%.

Bestaat meestal uit 2 afspraken:

- Endo start: +- 30 min
- Endo afmaken: gewenste tijd van de desbetreffende tandarts

Heel af en toe is het niet mogelijk om een endo te doen bij een normale tandarts. De tandarts zal de patiënt dan doorsturen naar een endodontoloog.

Reden van doorsturen naar endodontoloog kan zijn:

- Vindbaarheid van de kanalen
- Kromming van kanalen
- Complicaties opgetreden (perforatie)

Verdoving:

- In de bovenkaak kunnen we per elementen verdoven.
- In de onderkaak is vaak de halve onderkaak verdoofd (incl. halve tong)

Kroon:

- Afspraak 1: Kroon omslijpen, afdrukken en noodkroon plaatsen

Heel af en toe komt de noodkroon los, dan kan er een afspraak van 20 minuten ingepland worden voor het terugplaatsen van de noodkroon.

- Afspraak 2: Noodkroon eraf gehaald en definitieve kroon plaatsen

Implantaat: Gedaan door Renato en/ of Gwan

- Afspraak 1: Consult + röntgenonderzoek (20min)
- Afspraak 2: Plaatsen implantaat (60 min)
- Afspraak 3: Nacontrole plaatsing (10 min)
- 3 maanden na plaatsen implantaat:
- Afspraak 4: Afdrukken implantaatkroon (30 min)
- Afspraak 5: Kroon plaatsen

Bleken: Normaliter bij Shiela, als het om een groter esthetisch plan gaat, dan bij YL.

- Afspraak 1: Afdrukken
- Afspraak 2: Uitleg + bleekmiddel meegegeven (1 week na afdrukken)
- Afspraak 3: Bleekresultaat beoordelen

Soorten bleekmiddel die wij gebruiken:

Bite & white tube: €25 euro (overdag 1 uur)

Home kit Day PrevDent: €75 euro (overdag 1,5 – 2 uur)

Home kit Night PrevDent: €75 euro ('s nachts 4 – 6 uur)

Na bezwaren:**Diepe cariës behandeld?:**

Kloppende niet te houden pijn die gevoelig is bij warm/ koud of bij aanraking denk aan pulpitis.

Tandvlees weggehaald?:

Pijn van tandvlees na het uitwerken van de verdoving.

Vulling te hoog?:

Vraag aan de patiënt of de kiezen links en rechts te gelijk op elkaar komen. Zo niet dan korte afspraak om vulling bij te werken.

Pijn na parodontitis behandeling:

Napijn is normaal. Adviseer pijnstilling (die de patiënt mag). Pijn kan weken aanhouden, adviseer de patiënt om goed te blijven rageren en poetsen.

Pijn na endo:

Dit komt vaak voor! Adviseer pijnstilling of af te wachten tot endo af gedaan wordt. Is de pijn echt niet te houden plan dan een afspraak in bij de behandelaar.

Noodkroon losgekomen:

Probeer een patiënt zo snel mogelijk in te plannen bij dezelfde behandelaar.

Napijn implantaat:

Bij aanhoudende klachten iom behandelaar inplannen

Napijn extractie:

De tandkas kan ontsteken – alveolitis (bijv. dry socket). Gebeurt vaak bij rokers!!

Patiënt laten spoelen met zoutoplossing en pijnstilling adviseren. Bij aanhoudende klacht afspraak inplannen bij behandelaar.

Nabloeding?

Tijdens werktijden z.s.m. inplannen bij behandelaar, anders zal de dienstdoende tandarts de patiënt zien.

De tandarts zal de wond (opnieuw) hechten.

Bleken:

Tandvlees en tanden worden vaak gevoelig. Adviseer om af te wachten met bleken tot pijn is afgezaakt.

Q&A:

Wat kan in 30 minuten gedaan worden qua spoedklachten?

- Endo start

Wat kan in 20 minuten gedaan worden qua spoedklachten?

- Pijn na trekken
- Nabloeding

Implantaat met botopbouw, wat is dat?

Soms moet er extra bot geplaatst worden om de wanddikte breder te maken zodat er een implantaat schroef in geplaatst kan plaatsen.

Kunnen patiënten na een endo/ vulling weer direct eten?

- In principe kunnen patiënten na een vulling weer direct eten. Vullingen zijn direct hard d.m.v. de uithardingslamp.

Amalgaamvullingen, moeten deze perse vervangen worden?

- Niet lekkende amalgaamvullingen kunnen in de mond blijven zitten.
- Tegenwoordig vullen we niet meer met amalgaam.

Bloedverduunners:

Op het moment dat een extractie plaats vind dan is de bloedverdunner een anti-stollingsmiddel.

Loopt een patiënt bij de trombosedienst, dan moet er af en toe een afspraak plaats vinden om INR aan te passen. *Overleg dan altijd even met de behandelaar over wat te doen!*

Bleken, slecht voor je tanden?

Elke behandeling heeft risico's, maar bleken is een veilige behandeling mits deze op een juiste manier door een tandarts of mondhygiënist wordt uitgevoerd. Gevoeligheid van de tanden kan optreden, maar verdwijnt doorgaans na het bleken weer.

Spalkje eruit, wat nu?

- Afspraak bij een behandelaar (bijv. Sandra) voor afdrukken nieuwe spalk

Spalk los, wat nu?

- Afspraak bij een tandarts voor vastzetten spalk.

Pijnstilling, wat als paracetamol niet werkt?

- Adviseer paracetamol in combi met Ibuprofen.

Vraag de patiënt wel altijd of ze deze pijnstilling mogen!

Bij maag/ darm klachten? > Waar nodig maagbeschermers voor laten schrijven door tandarts