

Anesthesie

Doel

Het (in opdracht van de tandarts) geven van een plaatselijke verdoving.

Benodigheden

- Anesthesiemiddelen

Werkwijze

Assistente/mondhygiëniste/tandarts

- Controleer de anamnese of er beperkingen zijn ten aanzien van gebruik van verdovingsmiddelen.
- De tandarts geeft de verdoving of delegeert dit aan de assistente.
- Indien dit nodig is of op verzoek van de patiënt (ASA1) mag de mondhygiëniste altijd verdoven bij tandsteen verwijderen.
- Delegeren naar de assistente gebeurt niet bij een patiënt die medisch gecompromitteerd is of indien de verdoving mandibulair toegediend moet worden.
- In de praktijk wordt standaard gewerkt met middel:
 -
- Indien niet anders aangegeven, wordt hiermee verdoofd.
- Bij uitzondering wordt in opdracht van de tandarts verdoofd met:
 -
- Licht de patiënt in over de verdoving en vraag om toestemming.
- Anesthesie controleren op houdbaarheid.
- Anesthesie klaarmaken en toedienen.
- Test de werking van de anesthesie voor het uitvoeren van de behandeling. Indien nodig verdooft de tandarts zelf bij.
- De gebruikte naald niet recapen, maar direct via een safety-point vernietigen.
- In het patiëntendossier vermelden wie de verdoving heeft gegeven. Vermelden als niet met het standaard middel is verdoofd.

Criteria

- Patiënt juist verdoofd tijdens behandeling.
-