

Initiële parodontale therapie

Doel

Het ontstekingsvrij maken van het parodontium van de patiënt, zodat hij/zij het met relatief eenvoudige middelen ontstekingsvrij en in een goede conditie kan houden.

Benodigdheden

- Anesthesiespuit en –carpules
- Spiegel, sonde, pocketsonde, furcatiesonde
- Parotray met scalers en curettes
- 3 x 4 gaasjes
- Röntgenfoto's
- Polijsthoekstuk
- Polijstborsteltje en –cupje
- Polijstpasta
- Meerfunctiespuit
- Ultrasoon tandsteenapparaat
- Corsodyl
- Hoekstukken (overhangende restauraties)

Werkwijze

Preventieassistent/ Mondhygiënist

Patiënt komt vanuit de diagnostiek d.m.v. dpsi-score of (pijn) klachten binnen.

Analyseren waar probleem ligt, lokaal of gegeneraliseerde gingivitis of parodontitis uitgevoerd a.d.h.v. klinische metingen.

Bij gingivitis wordt een instructie gegeven, eventueel ondersteund met chloorhexidine en waar nodig tandsteen verwijderen.

Bij lokale parodontitis als diagnose: röntgenfoto's, geen uitgebreide parodontiumstatus maar pocketstatus en plak en bloedingstest.

Uiteenzetten van problemen en voorgestelde behandeling.

Hierna volgt behandeling: reiniging sub en supragingivaal door gehele mond en hierbij uitgebreide mondhygiëne instructies met eventueel chloorhexidine mondspoeling ter ondersteuning.

Na drie tot vier maanden herbeoordeling en eventueel verdere behandeling.

Bij gegeneraliseerde parodontitis; röntgenstatus, parodontiumstatus en uitgebreid behandelplan opstellen en bespreken.

Behandeling uiteenzetten: uitgebreid sub- en supragingivaal reinigen door gehele mond met scalers/curettes en/of tandsteenapparaat in meerdere zittingen, eventueel met lokaal anesthesie.

Na 3 maanden controle op bloeding, bijstellen en begeleiden van mondhygiëne en eventueel aanwezig tandsteen en plak nog verwijderen.

Drie maanden later herbeoordeling met pocket/parodontiumstatus met tandarts.

Initiële parodontale therapie

Preventieassistent/ Mondhygiënist

Bij restproblemen eventueel parochirurgie.

Indien situatie niet stabiel hierna, dan eventueel doorsturen naar parodontoloog.

Verslaglegging in de patiëntenkaart

In de patiëntenkaart wordt duidelijk maar toch bondig, iets genoteerd over bloeding, plak, pockets, recessies en mondhygiëne van de patiënt. Tevens wordt er genoteerd wat de vervolgbehandeling is.

Criteria

- Ontstekingsvrij parodontium.
 - Sub- en supra gingivaal tandsteen is verwijderd.
 - Klachtenvrij blijven.
 - Instructies goed opvolgen.
 - Therapietrouw blijven.
-