

Paro recall

Doel

Het routinematig onderhouden en beoordelen van parodontale restproblemen.

Benodigdheden

- Anesthesiespuit en –carpules
- Spiegel, sonde, pocketsonde, furcatiesonde
- Parotray met scalers en curettes
- 3 x 4 gaasjes
- Röntgenfoto's
- Polijsthoekstuk
- Polijstborsteltje en -cupjes
- Polijstpasta
- Functiespuit
- Ultrasoon tandsteenapparaat
- Corsodyl
- Disclosing vloeistof

Werkwijze

Mondhygiënist

Patiënt komt na een vooraf bepaalde periode (3, 4 of 6 maanden) terug voor verwijderen van eventuele plak en/of tandsteen.

Evaluatie van mondhygiëne, indien nodig met een kleurtest gevolgd door mondhygiëne instructie.

Reiniging van het hele gebit en eventuele restpockets.

Opnieuw vaststellen van een interval voor recall of herbeoordeling.

Verslaglegging in de patiëntenkaart

In de patiëntenkaart wordt duidelijk maar toch bondig, iets genoteerd over bloeding, plak, pockets, recessies en mondhygiëne van de patiënt. Tevens wordt er genoteerd wat de vervolgbehandeling is.

Criteria

- Ontstekingsvrij parodontium.
 - Sub- en supra gingivaal tandsteen is verwijderd.
 - Klachtenvrij blijven.
 - Instructies goed opvolgen.
 - Therapietrouw blijven.
 - Motivatie
-