

Abutmentoperatie

Doel

Bij 2-fasige implantaatsystemen /implantaatoperaties, de implantaten vrijleggen en een healingabutment plaatsen, dat door de gingiva/mucosa heen steekt. Daarna het onderzoeken van de stabiliteit van de implantaten.

Na minimaal 2 maanden in de OK. Na minimaal 4 maanden in de BK. Bij kampopbouw/sinuslift: 2 maanden langer wachten.

Bij 1-fasige implantsystemen/ implantaatoperaties, de stabiliteit van de implantaten onderzoeken.

Instrumentarium

- Spiegel + spuit en naald + verdovingsvloeistof
- Kleine OP set + 1 mesje of punch/ eventueel hechtdraad (zijde 4/0)
- Gaasjes
- Doosje schroevendraaiers
- Doosje met abutments van het gebruikte implantaatsysteem
- Onderzoekshandschoenen + mondmasker
- TX-foto

Apparatuur

- Electrotroom
- RX-apparatuur
- Osstell mentor i.c.m. Smartpegs

Werkwijze

- Anesthesie.
- Perforatie tandvlees met punch/mesje (ev. Papilcreactietechnieken).
- Verwijderen gingiva met elctrotroom.
- Verwijderen coverscrew(s).
- Keuze healing abutment + plaatsing.
- Eventueel hechten.
- Controle stabiliteit door tikken op abutments en Osstell mentor.
- Controle ingroei a.d.v. RX.

Bij 1 fasige systemen valt vrijleggen weg en wordt direct gestart met stap 7.

Criteria

- Doorverwijzing naar tandarts met overzicht hoogte abutments.
- Meegeven enveloppe voor retourzending abutments.
- Osstell mentor procedure: zie handleiding Cd.rom.

Tijdsduur

15 tot 30 minuten.