

Paro recall

Doel

Het routinematig onderhouden en beoordelen van parodontale restproblemen.

Benodigdheden

- anesthesiespuit en –carpules (indien nodig)
- tray met spiegel, sonde, pocketsonde, furcatiesonde, pincet
- 3 a 4 gaasjes
- polijsthoekstuk
- polijstborsteltje en – cupjes
- polijstpasta
- functiespuithoesje en - tip
- EMS hoekstuk
- EMS-tips
- geslepen handinstrumenten
- disclosing vloeistof
- chloorhexidine
- wattenstaafjes
- vaseline

Werkwijze Mondhygiëniste of paropreventie assistente

Patiënt komt na een vooraf bepaalde periode (3,4 of 6 maanden) terug voor verwijderen van eventuele plak en/of tandsteen

-Behandeldijournal doorlezen zodat je weet met wat voor een soort patiënt je te maken hebt.

Met name de laatste parodontiumstatus bekijken

-Kennismaking

-Vragen naar specifieke klachten/problemen:

Bij gebruik van antibioticumkuur na vorige zitting vragen hoe dat verlopen is en of de kuur volgens instructie is ingenomen.

Algemene gezondheid navragen en bijzonderheden/veranderingen noteren.

-Pockets controleren

Risicoplaatsen:

Molaarstreek met name de furcatiegebieden!

Diepe pockets op parodontiumstatus

Elementen waar patiënt last van heeft

-Lippen invetten en kleuren, (elke keer, behalve bij absolute uitzonderingsgevallen)

-Plak en bloeding nalopen en noteren

Aanvullende instructie mondhygiëne: Braun indien nodig en ragermaten altijd controleren

-Patiënt 1 minuut laten spoelen met chloorhexidine

-Gebitsreiniging (zoveel mogelijk met EMS) + polijsten

Documentnummer : 4.5.4

Versienummer : 1

Datum : 04-01-2019

Pagina 2 van 2

Paro recall

-Indien nodig fluoridelak of chloorhexidinelak aanbrengen op specifieke risicoplaatsen, "bijvoorbeeld tunnels" Indien er ook maar enig cariës risico bestaat vragen tunnels 200% aandacht, patiënten dan ook zelf fluoride (-gel of – spoeling) in tunnels laten aanbrengen.

-Suiker anamnese afnemen in geval van veel wortelcariës.

-Zorgen dat de patiënt "schoon" de behandelkamer verlaat en ervoor zorgen dat de juiste afspraak voor vervolgbehandeling wordt gemaakt. Houdt ook in de gaten wanneer de patiënt weer bij de tandarts wordt verwacht voor herbeoordeling of een chirurgie.

-Indien zichtbare verslechtering dan risico factoren: plak, roken, stress en algehele gezondheid met patiënt bespreken en aan tandartsparodontoloog kaart voorleggen om plan eventueel tussentijds te wijzigen.

-Relevante gegevens toevoegen aan het patientendossier

MA noteren

MH-niveau noteren en de instructies die gegeven zijn

Noteren wat er gedaan is en wat er gebruikt is aan materiaal, o.a. anesthesie

Aan het eind noteren hoeveel tijd je bezig geweest bent als het afwijkt van je invoercode

Declareren behandeling: MH-middelen niet vergeten!!

Criteria

- Ontstekingsvrij parodontium
- Sub- en supra gingivaal tandsteen is verwijderd
- Klachtenvrij blijven
- Instructies goed opvolgen
- Therapietrouw blijven
- Motivatie