

Kroonverlenging

Doel

Het verlagen van de aangehechting opdat de gekozen prothetische voorziening kan worden uitgevoerd.

Benodigheden

- Controle tray (pocketsonde, furcatiesonde, spiegel)
- Anesthesiespuit met 3 carpules en naald

- Perio-Aid in bekertje
- Anesthesiecarpules in alcohol
- Muts en beschermbril voor patiënt
- Loepbril voor tandarts
- Mutsen en mondkapjes voor assistente en tandarts
- Bril assistente
- Steriele handschoenen assistente en tandarts
- Naald
- Recepten en Brufen

- Chirurgetafel
- Fysiologisch zoutoplossing

Chirurgetafel Kroonverlenging

- Muts op en mondkapje voor, handschoenen aan
 - Klem om alles steriel op te pakken

 - 2 x afdekdoek
 - Chirurgische flapset
 - 2-3 rechte mesjes en 1 kromme
 - Vaseline
 - Groene afzuigslang
 - Hechtdraad (tandarts bepaalt welke)
 - 2 stalen bekertje, waarvan 1 met fysiologisch zout
 - Rood hoekstuk
 - Borenblokje
-

Kroonverlenging

Werkwijze

Assistente

Kamer operatie klaarmaken.
Patiënt in de stoel zetten.
Laten spoelen met Perio-aid (1 minuut).

Recepten en Brufen klaarleggen.
Mondgebied patiënt schoonmaken met Perio-aid.
Muts en bril bij patiënt opzetten.
Zelf hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.

Steriele doeken over de borst van de patiënt leggen met ketting vastmaken.
Afzuigslang van behandelaar aanpakken.
Aansluitslang boor aangeven aan behandelaar.
Schroefnaald op de carpulespuit.

Steriele handschoenen aan.

Afzuigen en de wang afhouden.
Afzuigslang doorspoelen met fysiologisch zout.

Mond schoonmaken.
Doek verwijderen.

Relevante gegevens toevoegen aan het patiëntendossier.

Bespreken vervolgafspraken.

Tandarts

Uitleg geven aan patiënt.

Operatiegebied met pocketsonde nalopen.
Anesthesie geven.
Hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.
Steriele handschoenen aan.

Afzuigslang aangeven.
Bevestig slang aan doek met een doekklem
Vul de waterspuit
Aansluitslang boor aanpakken en beschermhoes over boorslang schuiven.
Carpulespuit aanreiken voor schroefnaald.

Controleer mate van anesthesie met pocketsonde.

Maak incisie.
Gingiva afschuiven.
Verlaag het botniveau.

Hechten en lap 3 minuten aandrukken.
Mesjes en naalden in afvalbakje.
Patiënt rechtop zetten.

Instructie nabezwaren met folder meegeven.
Recepten Perio-aid en Brufen meegeven.

Criteria

- Bereikbaar maken van de tandhals
 - Pijnloze behandeling
 - Tevreden patiënt en verwijzer
-