

Paro chirurgie

Doel

Het reduceren van restpockets en beter toegankelijk maken van interdentale ruimten na initiële therapie.

Het met direct zicht scalen van chronisch ontstoken en verdiepte pockets.

Benodigdheden

- Controle tray (pocketsonde, furcatiesonde, spiegel)
- Anesthesiespuit met 3 carpules en naald

- Pocket/parodontium status
- Röntgenfoto's
- Perio-Aid in bekertje
- Anesthesiecarpules in alcohol
- Muts en beschermbril voor patiënt
- Loepbril voor tandarts
- Mutsen en mondkapjes voor assistente en tandarts
- Bril assistente
- Steriele handschoenen assistente en tandarts
- Naald
- Recepten en Brufen

- Chirurgietafel

- Fysiologisch zoutoplossing voor boor
- Apparaat voor lichtje en blauwe aansluitslang
- Voetpedaal klaarzetten
- Fysiologisch zout voor op chirurgietafel

Chirurgietafel

- Muts op en mondkapje voor, handschoenen aan
 - Klem om alles steriel op te pakken

 - 2 x afdekdoek
 - Chirurgische flapset
 - 2-3 rechte mesjes en 1 kromme
 - Vaseline
 - Blauw hoekstuk
 - Boortjes
 - Afzuigslang
 - Hechtdraad 4/0 45 cm of 75 cm
 - 2 stalen bekertjes, waarvan 1 met fysiologisch zout
 - 2 boorhoezen
 - Scalpers
-

Paro chirurgie

Parochirurgie met regeneratie

- Emdogain (naald en carpule) uit koelkast klaarleggen

Werkwijze

Assistente

Kamer operatie klaarmaken.
Patiënt in de stoel zetten.
Laten spoelen met Perio-aid (1 minuut)

Recepten en Brufen klaarleggen.
Mondgebied patiënt schoonmaken met Perio-aid.
Muts en bril bij patiënt opzetten.
Zelf hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.

Steriele doeken over de borst van de patiënt leggen met ketting vastmaken.
Afzuigslang van behandelaar aanpakken en aansluiten eventueel met lampje.
Aansluitslang boor aangeven aan behandelaar.
Schroefnaald op de carpulespuit.
Indien nodig Emdogain op tafel uitstorten.

Steriele handschoenen aan.

Afzuigen en de wang afhouden.
Afzuigslang doorspoelen met fysiologisch zout.

Mond schoonmaken.
Doek verwijderen.

Tandarts

Uitleg geven en indien patiënt eerder is geopereerd informeren hoe dat is gegaan.

Operatiegebied met pocketsonde nalopen.
Anesthesie geven.
Hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.
Steriele handschoenen aan.

Afzuigslang aangeven.
Bevestig slang aan doek met een doekkleem
Vul de waterspuit
Aansluitslang boor aanpakken en beschermhoes over boorslang schuiven.
Carpulespuit aanreiken voor schroefnaald.

Controleer mate van anesthesie met pocketsonde.
Eventueel hechtingen van vorige operatie verwijderen.

Maak incisie.
Verwijderen van weefsel grof en fijn.

Rootplaining.
Botdefecten corrigeren.
Indien nodig Emdogain aanbrengen.
Weefsellap uitdunnen.

Hechten en lap 3 minuten aandrukken.
Mesjes en naalden in afvalbakje.
Patiënt rechtop zetten.

Instructie nabezwaren met folder meegeven.
Recepten Perio-aid en Brufen meegeven.

Bespreken vervolgafspraken

Relevante gegevens toevoegen aan het patientendossier

Paro chirurgie

Criteria

- Reduceren van restpockets.
 - Beter reinigbaar gebit.
 - Pijnloze behandeling.
-