

Nazorg parochirurgie

Na één week: hechtingen verwijderen

Doel

Verwijderen hechtingen en nazorg instructie voor optimale wondgenezing.

Benodigdheden

- Spiegeltje
- Sonde
- Pincet
- Hechtingschaartje
- Gaasje 3x3

Werkwijze

Assistente	Tandarts
Patiënt in de stoel laten plaatsnemen.	Informeren over verloop operatie en eventuele klachten.
Wang afhouden. Hechtingen doorknippen.	Verwijderen wondverband met sonde en pincet. Verwijderen hechtingen. Schoonmaken operatiegebied met schoon gaasje. Meegeven instructie mondreiniging.
Maken van een afspraak voor polijsten en bijsturen van de mondhygiëne.	
Relevantie gegevens toevoegen aan het patiëntendossier.	

Criteria

- Verwijderen wondverband en hechtingen.
- Controle genezing.
- Instructie patiënt over verdere verzorging.

Nazorg parochirurgie

Nazorg na parochirurgie (6 weken)

Doel

De mondhygiëne van de patiënt aanpassen aan de nieuw ontstane situatie door middel van instructie. De patiënt motiveren. Het elimineren van plakretentiefactoren (veelal aanslag van het spoelen met Chloorhexidine). Grondige reiniging van het gebit, uitgezonderd van het chirurgisch behandelde deel.

Benodigdheden

- Tray met spiegel, evt. sonde , pocketsonde, furcatiesonde
- 3 x 4 gaasjes
- Parodontiumstatus
- Medische anamnese
- Functiespuit
- Chloorhexidine
- Handspiegel
- Materiaal voor mondhygiëne-instructie (ragers, gaas, tandenborstel enz.)
- Polijsthoekestuk met cupje
- Polijstpasta of puimsteen
- Wattenstaafje
- Vaseline
- Disclosing
- Röntgenfoto's

Werkwijze

Informeren bij patiënt hoe het gaat. Of patiënt veel last heeft van gevoeligheid, mobiliteit, uitleggen dat dit bij een goede mondhygiëne na verloop van tijd over gaat.

Sonderen om te beoordelen of er op specifieke plekken nog zwelling of BOP is, zodat je je op deze plaatsen extra kunt richten tijdens de instructie.

Plak kleuren om de patiënt zelf een beeld te geven van de plaatsen die nog beter gereinigd kunnen/moeten worden.

Instructie geven in de nieuwe situatie, dit zal meestal betekenen grotere ragers. Mogelijk dat er een wortel amputatie heeft plaatsgevonden, of een ondermolaar die getunneld is, dan goed instructie geven met cosodylgel om wortel cariës te voorkomen.

Patiënt 1 minuut laten spoelen met chloorhexidine.

Gebitsreiniging. Met handinstrumenten of ultrasone apparatuur eventuele plakretentiefactoren verwijderen, Bijvoorbeeld tandsteen in het onderfront of aanslag van het chloorhexidine spoelen. Het is wel belangrijk dat het onlangs chirurgisch behandelde gebied niet onnodig overbehandeld wordt.

Bespreken van vervolgafspraken

Relevante gegevens toevoegen aan het patiëntendossier.

Nazorg parochirurgie
