

Recessiebedekking

Doel

Herstellen van de aangehechte gingiva bij recessies ten behoeve van de esthetiek.

Benodigdheden

- Controle tray (pocketsonde, furcatiesonde, spiegel)
- Anesthesiespuit met 3 carpules en naald
- Perio-Aid in bekertje
- Anesthesiecarpules in alcohol
- Muts en beschermbril voor patiënt
- Loepbril voor tandarts
- Mutsen en mondkapjes voor assistente en tandarts
- Bril assistente
- Steriele handschoenen assistente en tandarts
- Naald
- Recepten en Brufen
- Chirurgietafel
- Fysiologisch zoutoplossing

Chirurgietafel Recessiebedekking

- Muts op en mondkapje voor, handschoenen aan
 - Klem om alles steriel op te pakken
 - 2 x afdekdoek
 - Chirurgische flapset
 - 2-3 rechte mesjes en 1 kromme
 - Vaseline
 - Groene afzuigslang
 - Hechtdraad (tandarts bepaald welke)
 - 2 stalen bekertje, waarvan 1 met fysiologisch zout
 - Fijne hechtang
-

Recessiebedekking

Werkwijze

Assistente

Kamer operatie klaarmaken.
Patiënt in de stoel zetten.
Laten spoelen met Perio-aid (1 minuut).

Recepten en Brufen klaarleggen.
Mondgebied patiënt schoonmaken met Perio-aid.
Muts en bril bij patiënt opzetten.
Zelf hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.

Steriele doeken over de borst van de patiënt leggen met ketting vastmaken.
Afzuigslang van behandelaar aanpakken
Schroefnaald op de carpulespuit.

Steriele handschoenen aan.

Afzuigen en de wang afhouden.
Afzuigslang doorspoelen met fysiologisch zout.

Mond schoonmaken.
Doek verwijderen.

Relevante gegevens toevoegen aan patientendossier.

Bespreken vervolgafspraken

Criteria

- Herstellen recessie
- Goede esthetiek.
- Tevreden patiënt

Tandarts

Uitleg geven en indien patiënt eerder is geopereerd informeren hoe dat is gegaan.

Operatiegebied met pocketsonde nalopen.
Anesthesie geven.
Hoofdmuts op, mondmasker voor, bril op,
Handen desinfecteren met handalcohol.
Steriele handschoenen aan.

Afzuigslang aangeven
Bevestig slang aan doek met een doekklem
Vul de waterspuit

Carpulespuit aanreiken voor schroefnaald.

Controleer mate van anesthesie met pocketsonde.

Maak incisie.
Losmaken aangehechte gingiva.
(Bij vrijgingiva-transplantaat uit palatum bovenkaak transplantaat snijden.
Aanhechten vrijgingivatransplantaat.)
Aanhechten gingiva op gewenste hoogte.

Mesjes en naalden in afvalbakje.
Patiënt rechtop zetten.

Instructie nabezwaren met folder meegeven.
Recepten Perio-aid en Brufen meegeven.