

Controlebezoek retentiefase

Doel

Na het afsluiten van de actieve behandelfase wordt de cliënt nog een periode vervolgd om het resultaat te stabiliseren. Afspraken worden in de regel gepland na 2 maanden (eindrecords maken), na 8 maanden en na 20 maanden.

Benodigdheden

- Spiegel en sonde

Werkwijze

- Vraag aan cliënt en eventuele begeleider of er vermeldenswaardige bijzonderheden zijn, noteer in het dossier als er bijzonderheden zijn (aspecten als: motivatie/medewerking, pijn/ongemakken, traumata, tevredenheid met het resultaat).
- Beoordeel de mondhygiëne en neem eventueel actie door instructie of recall afspraak, noteer in het dossier
- Controleer op losse retentiedraden andere afwijkingen aan de retentieapparatuur, noteer in het dossier, neem actie of maak nieuwe afspraak voor herstel.
- Kijk in het dossier of er bij de vorige afspraak al aanwijzingen zijn gegeven voor deze afspraak (bijvoorbeeld het maken van eindrecords), zo ja voer deze uit, noteer op de behandelkaart en maak een nieuwe afspraak.
- Zijn er bij de vorige afspraak geen aanwijzingen voor deze afspraak gegeven, laat dan de tandarts het verder te volgen retentiebeleid vaststellen en bespreken met de cliënt en eventuele begeleider. Noteer de bijzonderheden en adviezen en het besprokene in het dossier, maak een nieuwe afspraak voor retentiecontrole, tenzij door de tandarts aangegeven dat er een andere vervolgafspraak nodig is.
- Zorg ervoor dat er een maandtarief wordt gedeclareerd.

Criteria

Voor een juiste uitvoering van deze werkinstructie zijn: de conditie van de retentie apparatuur en de mondhygiëne zijn gecontroleerd, correcte verslaglegging in het cliëntdossier van de status van de retentie van de behandeling en datgene dat is gedaan en is besproken, de cliënt is weer bij wat betreft de retentie van de behandeling.